

DEVILTOP SENSITIVE PASTA FLUO

Готова за употреба родентицидна примамка под формата на паста за масови потребители (Продуктов тип 14) за контрол на домашни мишки (на закрито) и сив плъх (на закрито и на открито около сгради)

DEVILTOP SENSITIVE PASTA FLUO

Готова за употреба родентицидна примамка под формата на паста (Продуктов тип 14)

Главна група 3 - Контрол на вредители.

Продуктов тип 14 - Родентициди.

Съдържа 0.0029 g/100 g Бродифакум (CAS № 56073-10-0)

UFI: 5U20-N08G-D00T-GKXW

Предупреждение за опасност

H373 Може да причини увреждане на органите (кръвта) при продължителна или повтаряща се експозиция

Препоръка за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P103 Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.

P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ

P501 Съдържанието/Съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба

Разрешение № 3404-3/30.06.2026 г.

Притежател на разрешението/доставчик: **ZAPI S.p.A.** Via Terza Strada, 12 35026 Conselve (PD) Италия - Тел. +39 049 9597737 www.zapispa.com - info@zapispa.com



ВНИМАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

DEVILTOP SENSITIVE PASTA FLUO е готова за употреба примамка под формата на паста в единични сашета от 15 g за контрол на домашни мишки и сив плъх във всички стадии на развитие, съдържаща високоефективно вещество бродифакум, активна съставка за еднократно поемане от второ поколение антикоагуланти. Благодарение на начина си на действие смъртта на гризачи се осъществява, без да предизвиква подозрение към примаката от останалите членове на колонията.

DEVILTOP SENSITIVE PASTA FLUO родентицид представя следните иновативни функции:

- Технология FLUO-NP®: благодарение на технологията с флуоресцентен пигмент, примамката може лесно да се идентифицира дори при лоши условия на осветление. Когато примаката се консумира от гризачи, флуоресцентната формулация прави изпразненията на гризачите ясно видими под ултравиолетова светлина, което дава възможност да се наблюдава активността на гризачите.

- PASTA PLUS: формула съчетаваща добре балансирана комбинация от компоненти от хранителен произход, като например млечно брашно, захар и мазнини, обогатени със зърнени храни, особено вкусни за споменатите по-горе видове гризачи.

Благодарение на силната си апетитност, примаката под форма на паста е изключително подходяща и се използва в зони, предлагащи силно конкурентно хранене.

DEVILTOP SENSITIVE PASTA FLUO включва горчив агент (*Denatonium Benzoate*), който помага да се предотврати човешката консумация.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Категория на потребителите: масови потребители.

Метод на приложение: Готова примамка за използване в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на препарата от деца и нецелесъобразни животни. защитени срещу манипулации поставки за примамка.

Доза и честота на приложение:

⇒ За контрол на домашни мишки (*Mus musculus*) – употреба на закрито:

- Висока степен на заселеност – До 50g примамка в една дератизационна кутия на всеки 2 метра;
- Ниска степен на заселеност – До 50g примамка в една дератизационна кутия на всеки 5 метра.

Поставките за примамка трябва да се посещават най-малко веднъж на всеки 2—3 дни в началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими (не са замърсени или намокрени) и за да се отстранят трупове на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост. Това продължава докато консумацията спре.

⇒ За контрол на сиви плъхове (*Rattus norvegicus*) – на закрито и на открито около сгради:

- Висока степен на заселеност – До 90g примамка в една дератизационна кутия на всеки 5 метра.
- Ниска степен на заселеност – До 90g примамка в една дератизационна кутия на всеки 10 метра.

Поставките за примамка трябва да се посещават само в период от 5—7 дни след началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими (не са замърсени или намокрени) и за да се отстранят трупове на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост. Това продължава докато консумацията спре.

При употреба на открито около сгради: Поставяйте поставките за примамка на места, защитени от наводняване. Сменяйте всяка примамка в поставка, в която примамката е повредена от вода или замърсена.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Винаги четете информацията за продукта и данните, придружаващи продукта или предоставени на мястото на продажба, преди да го използвате и следвайте указанията в посочените инструкции.

Преди употребата на отровната примамка за гризачи е необходимо да се идентифицират видовете гризачи, вероятните причини за нападението и интензитета му.

Отстранете леснодостъпната за гризачите храна (напр. разсипано зърно или хранителни отпадъци). Не правете обаче друго почистване на нападнатата област непосредствено преди третирането, защото това само ще обезпокои популацията от гризачи и ще затрудни приемането на примамката.

Продуктът трябва да се използва само като част от система за интегриран контрол на вредители, включващ освен всичко друго мерки за хигиена и при възможност нехимични методи за контрол (например използването на капани).

Поставките за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата със забелязани действия на гризачи (напр. пътеки, свърталища, хранилки, дупки, тунели и пр.). Примамките се фиксират вътре в кутията, за да не бъдат измъквани и разпилявани от гризачите. Когато продуктът се използва в еднородни пластмасови тавички, покривният защитен слой се разрязва след поставянето им в дератизационните кутии.

Където е възможно, поставките за примамка трябва да се закрепват за земята или за други конструкции.

Не отваряйте сашетата, съдържащи примамката.

Дератизационните кутии не се мият между отделните зареждания. Ако поемането на примамката е сравнително слабо, въпреки установената висока численост на вредителите, е необходимо дератизационните кутии да се преместят на други места или да се използва родентицид с друга формулация.

Поставяйте поставките за примамка извън досега на деца, птици, домашни любимци, селскостопански и други нецелесъобразни животни. Да се избягва третиране с продукта при наличие на незащитени храни и фуражи.

Поставяйте поставките за примамка далеч от храни, напитки и фураж, както и от съдове, прибори или повърхности в контакт с такива.

Не поставяйте поставки за примамка близо до отводнителни съоръжения, където могат да влязат в контакт с вода.

Докато използвате продукта, не се хранете, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и изложената на пряк контакт кожа, след като използвате продукта. Отстранете останалата примамка или поставките за примамка в края на периода на третирането.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА:

Преценете възможните превантивни мерки (запушване на дупки, възможно най-пълно отстраняване на потенциалните места за хранене и пиене), за да подобрите приемането на продукта и намалите вероятността от повторно нахлуване.

Продуктът не е предназначен за дълготрайна употреба - не се използва като постоянни отровни точки и мониторинг. Не използвайте антикоагулантни отрови за гризачи като постоянни примамки (напр. за предотвратяване на нахлуване или установяване на присъствие на гризачи). Използването на този продукт следва да елиминира гризачите в рамките на максимум 35 дни. Ако през целия период на третиране примамките продължават да се изяждат и не се наблюдава спад в числеността на гризачите, трябва да се определи вероятната причина за това. След като се изключат другите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи. Тогава трябва да се прецени възможността за употреба на неантикоагулантни или по-силни антикоагулантни родентициди, а също и използването на капани като алтернативна мярка за контрол. В случай на съмнение за липса на ефикасност в края на третирането (т.е. все още се наблюдава активност на гризачи), потърсете съвет от доставчика на продукта или се обадете на служба за борба с вредителите. Умрелите гризачи се премахват на чести интервали по време на дератизацията, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. При някои обстоятелства може да се изисква ежедневна проверка. Да се използват подходящи ръкавици при работа с умрели животни. Мъртвите гризачи се поставят в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД.

Биоцидът е опасен за дивите животни. Не се поставя в дупките на гризачите. Продуктът да не се използва за импулсно третиране.

По време и след приключване периода на третиране всички остатъци от примамката се събират и отстраняват по безопасен начин в съответствие с изискванията на националното законодателство. Да се използва шпатула при полагане (почистване/изхвърляне) на примамката.

Да се избягва ненужното излагане, особено да се избягва поглъщането. По време на боравенето с продукта не трябва да се яде, пие и пуши. Да се избягва контакт на продукта с кожата. Да се използват устойчиви на химикали защитни ръкавици. След употреба и преди хранене да се измиват ръцете и изложената кожа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ И СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Този продукт съдържа антикоагулантно вещество. Ако бъде погълнат, е възможно — с евентуално забавяне — да се появят симптоми от рода на кръвотечение от носа и венците. В тежки случаи може да се появят синини и кръв в изпражненията или урината.

Противоотрова: Витамин K1, който трябва да се дава само от медицински/ветеринарни специалисти.

При:

- Експозиция на кожата: да се измие с вода и след това с вода и сапун.
- Експозиция на очите: да се промият с течност за промивка на очите или вода, клепачите да се държат отворени поне 10 минути.
- Експозиция на устата: да се изплакне внимателно с вода. Нищо не трябва да се дава в устата на човек в безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане. При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ и покажете опаковката или етикета на продукта.

Обърнете се към ветеринарен лекар при поглъщане от домашен любимец. Опасно за дивата природа.

Дератизационните кутии трябва да бъдат надписани със следната информация: „Съдържа родентицид (отрова)”; „Да не се отваря и премества”; „Опасно за дивата природа”; „В случай на отравяне незабавно се обадете в Център по токсикология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов, Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233” „DEVILTOP SENSITIVE PASTA FLUO - Разрешение № 3404-2/17.02.2023 г.“; „активно вещество Бродифакум – 0.0029 g/100 g“

Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка: В края на третирането изхвърлете неизядената примамка и опаковката в съответствие с местните изисквания. Препоръчва се употребата на ръкавици.

Условия за съхранение и срок на годност: Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място. Дръжте съда затворен и далеч от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на места, недостъпни за деца, птици, домашни и селскостопански животни.

Срок на годност: 2 години от датата на производство.

Друга информация: Поради своето забавено действие, антикоагулантните отрови за гризачи дават резултат от 4 до 10 дни след поемането на примамката. Гризачите могат да пренасят болести. Не докосвайте мъртви гризачи с голи ръце, използвайте ръкавици или инструменти от рода на щипци, когато ги изхвърляте. Този продукт съдържа вгорчаващ агент и оцветител.

Партида n° и дата на производство: виж опаковката.

Опаковка: 150g